

Richtlinie

zur freiwilligen Sanierung von Ziegenbeständen

auf Caprine-Arthritis-Encephalitis (CAE)

der kooperierenden Ziegenzuchtverbände:

Hessischer Ziegenzuchtverband e.V.

Am Haingraben 16, Grünberg - Queckborn, Tel.:06401 / 5261

Landesverband Niedersächsischer Ziegenzüchter e.V.

Mars-la-Tour-Str.6, 26121 Oldenburg, Tel.: 0441 / 801 - 639

Landesverband Rheinischer Ziegenzüchter e.V.

Halfenslennefe 1, 51491 Overath, Tel.: 02204 / 72425

Landesverband der Ziegenzüchter Rheinland-Pfalz e.V.

Bahnhofsplatz 9, 56068 Koblenz, Tel.: 0261 / 91593-31

Landesverband Schleswig-Holsteiner Ziegenzüchter e.V.

Steenbeker Weg 151, 24106 Kiel, Tel.: 0431 / 332608

Landesverband Thüringer Ziegenzüchter e.V.

Am Johannishof 3, 99085 Erfurt, Tel.: 0361 / 74980713

Landesverband der Ziegenzüchter für Westfalen und Lippe e.V.

Nevinghoff 40, (Geb. LWK), 48147 Münster, Tel.: 0251 / 2376864

Landesschaf- und Ziegenzuchtverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Zarchliner Str.7, 19395 Karow, Tel.: 038738 /73071

Landesschafzuchtverband Sachsen-Anhalt e.V

Angerstr. 6, 06118 Halle, Tel.: 0345 / 5214941

1. Einleitung und allgemeine Bestimmungen

1.1 Einleitung

Die CAE der Ziegen gehört zu den Virusinfektionen (Lentiviren aus der Gruppe der Retroviridae). Sie ist eine langsam verlaufende Infektionskrankheit und kann bei allen Ziegenrassen auftreten.

Der CAE-Virus ist nahe verwandt mit dem Maedi-Visna-Virus der Schafe.

Typische Symptome sind z. B.:

- Gelenkentzündungen (Arthritiden)
vorrangig Veränderungen der Karpalgelenke
- Euterentzündungen
- chronische Lungenentzündungen
- Störungen des zentralen Nervensystems.

Auswirkungen der Krankheit können sein, z. B.:

- chronische Abmagerung bis hin zum Verenden der Tiere
- Rückgang der Milchleistung
- Fruchtbarkeitsstörungen
- Geburtsschwächen
- Vitalitätsschwächen.

Die klinischen Anzeichen gestatten nur eine Verdachtsdiagnose. Diese Diagnose ist nur durch serologische oder pathologisch-anatomische und histologische Untersuchungen abzuklären.

Die Wissenschaft nimmt an, dass eine Übertragung des CAE-Virus hauptsächlich über die Milch erfolgt, einschließlich Kolostrum infizierter Mutterziegen, aber auch über virushaltiges Nasensekret, Blut, Sperma oder die Atemluft.

Die Verbreitung des Erregers erfolgt hauptsächlich durch das Einstellen infizierter, nicht klinisch erkrankter Tiere.

Nach derzeitigem Wissensstand ist CAE auf den Menschen nicht übertragbar. Einmal positiv reagierende Tiere sind lebenslang Virusträger und bleiben positiv. Eine Heilung ist nicht möglich.

1.2 Allgemeine Bestimmungen

Die am freiwilligen Sanierungsverfahren teilnehmenden Ziegenbetriebe verpflichten sich, den Maßnahmen dieser Richtlinie Folge zu leisten. Die Bestände sind auf Dauer geschlossen zu halten. Tiere aus diesen Beständen dürfen direkten Kontakt (Deck- oder Ausstellungskontakt) nur zu Ziegen und Schafen aus anerkannten CAE-/Maedi-unverdächtigen Betrieben haben.

Schafe dürfen nicht im selben Stall und auf der selben Weide gehalten werden. Ist dieses jedoch der Fall, sind die Schafe auf selbe Weise / im gleichen Zeitraum auf Maedi zu untersuchen (Untersuchung auf Maedi-Visna-Virus).

Bei einem positiven Befund auf Maedi ist der CAE-Status erloschen.

Die Untersuchungsergebnisse sind dem Verband vorzulegen.

2. Ziele der Maßnahme zur CAE-Sanierung von Zuchtbetrieben

Ziel ist es, " CAE-unverdächtige " Ziegenbestände zu schaffen und diese zu erhalten.

Hierdurch sollen gleichzeitig wirtschaftliche Schäden, welche durch klinische Erkrankung der CAE auftreten können, vermieden werden.

3. Definition CAE-Status unverdächtig

3.1 CAE-Status unverdächtig Bestand

Ein Ziegenbestand erhält den Status CAE-unverdächtig, wenn bei vier serologische Untersuchungen bei allen Tieren, die älter als sechs Monate sind, ausschließlich negative Untersuchungsbefunde nachgewiesen und keine klinischen Befunde erhoben wurden.

Der Abstand zwischen den ersten drei Untersuchungen muss je sechs Monate betragen, der Abstand von der dritten zur vierten Untersuchung beträgt 12 Monate.

Der CAE-Unverdächtigkeitsstatus gilt auch für neu aufgebaute Bestände, sofern alle neu eingestellten Tiere aus CAE-unverdächtigen Beständen stammen.

Zur Aufrechterhaltung des Status eines Betriebes sind Folge-Untersuchungen im 12 monatigen abstand mit negativem Ergebnis aller über sechs Monate alten Ziegen nachzuweisen.

Der Status unverdächtig kann bei Sanierung frühestens nach zwei Jahren erreicht werden.

3.2 CAE-unverdächtige Ziegen/Böcke

Als CAE-unverdächtig gelten Ziegen aus Beständen unter Pkt. 3.1.

3.3 CAE-verdächtig Bestand

Als CAE verdächtig gilt ein Bestand, der positiv getestete Tiere hat, der keiner Sanierung angeschlossen ist, oder Kontakt mit Tieren hatte, die nicht nach Pkt. 3.1 eingestuft sind.

3.4 CAE-verdächtige Ziegen/Böcke

Als CAE-verdächtig gelten alle Tiere, bei denen verdächtige klinische Symptome oder serologisch fragliche Befunde aufgetreten sind. CAE-verdächtig ist ferner ein Tier, das positiv reagierte oder Kontakt mit nicht kontrollierten Tieren hatte. (siehe Pkt. 3.1)

Bei fraglichen Testergebnissen erfolgt nach Rücksprache mit der Untersuchungsstelle eine Nachuntersuchung

4. Möglichkeiten und Maßnahmen zur Sanierung

4.1 Sanierungsbeginn und Empfehlung

Bei der Erstuntersuchung wird der Bestandsstatus ermittelt (positive Tiere, negative Tiere, fragliche Tiere). Beträgt der Reagentenanteil weniger als 25 von Hundert, sollten alle CAE-positiven und verdächtigen Tiere sowie deren Nachzucht aus dem Bestand entfernt werden.

Bei einem Reagentenanteil von mehr als 25 von Hundert an CAE-positiven und -verdächtigen Tieren, sollte der gesamte Bestand entfernt werden. Die gesamte Stalleinrichtung ist hiernach zu reinigen und zu desinfizieren.

4.2 Möglichkeiten der Sanierung

4.2.1 Neuaufbau durch Ankauf von Tieren aus anerkannten CAE-sanierten Beständen.

4.2.2 Regelmäßige Blutuntersuchungen aller negativ reagierenden Ziegen in den geforderten Abständen, bis der Gesamtbestand 4 negative Untersuchungen aller Tiere nachweisen kann (Pkt. 3.1).

4.2.3 Mutterlose Aufzucht in der Sanierungsphase

- Handelt es sich um wertvolle Zuchtziegen, kann die Nachzucht der vorhandenen Ziegen unmittelbar nach dem Ablammen von der Mutter getrennt werden, ohne dass ein Kontakt mit den Muttertieren oder der Stallumgebung stattgefunden hat.
- Die Lämmer sind sofort in einen anderen räumlich getrennten Stall zu bringen und dürfen nur mit Ersatzkolostrum (z. B. Kuhmilch) oder Milchaustauschern aufgezogen werden.
- Diese Lämmer sind bis zur achten Lebenswoche nach der Geburt einer Blutuntersuchung zu unterziehen.
- Bei negativem Befund wird der regelmäßige Untersuchungsrythmus bis zur endgültigen Sanierung durchgeführt.

4.2.4 Wenn ein CAE-positives Tier bei den Untersuchungen festgestellt wird, beginnt die Sanierung von vorn. Die Erreichung des Status verlängert sich hierdurch zwangsläufig.

5. **Haltungs- / Hygieneanforderungen / Tierverkehr**

5.1 Grundsätze

- Die Bedeckung/Besamung der Ziegen darf nur durch Böcke erfolgen, die nachweislich CAE-negativ sind (Pkt. 3.1).
- Eine Fremdbedeckung von Tieren aus nicht sanierten Betrieben ist nicht zulässig.

5.2 Empfehlungen:

- Unbefugter Personenverkehr ist zu vermeiden. Berechtigte Personen (Tierarzt, Berater usw.) sollten die Ställe nur unter entsprechenden Vorkehrungen betreten (Schutzkleidung, Desinfektionsmatte etc.).
- Ohrmarkenzange und ähnliche Gerätschaften sind vor dem Einsatz zu reinigen und zu desinfizieren.
- Eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion (mindestens 1 x jährlich) der Ställe und Stalleinrichtungen sollte durchgeführt werden.
- In der Sanierung sollten räumlich voneinander getrennte Stallabteile zur Verfügung stehen:
 - ein Stallabteil für unverdächtige Tiere
 - ein Stallabteil für die Nachzucht unverdächtigter Tiere
 - ein Isolierstall für zugekaufte Tiere aus fremden sanierten Betrieben (Quarantänezeit 4 Wochen)
 - ein Stall für positive oder verdächtige Tiere während der Sanierungszeit
- Weideflächen und Ausläufe sollten so eingezäunt sein, dass ein Kontakt zu Nachbarbeständen (Ziegen/Schafe) vermieden wird.

5.3 Zukäufe

Zukäufe dürfen nur aus CAE-unverdächtigen Beständen erfolgen (Pkt. 3.1). Die Tiere sollten in einem Quarantänestall untergebracht und erneut auf CAE getestet werden.

Bei Zukäufen aus anderen deutschen Landesverbänden werden die CAE-Bescheinigungen anerkannt. Bei Zukäufen aus dem Ausland wird eine vorherige Überprüfung der dortigen CAE-Richtlinie empfohlen.

5.4 Ausstellungen / Auktionen

Tiere, die vorübergehend den Betrieb verlassen (zwecks Ausstellung oder Auktion etc.), dürfen nur zurück in den Betrieb, wenn sichergestellt ist, dass

der Kontakt nur zu Tieren aus anerkannten sanierten Beständen bestand (Pkt. 3.1). Die Veranstaltungen dürfen ausschließlich von sanierten Schaf- und/oder Ziegenbeständen beschickt werden.

Die Transportfahrzeuge sollten nach Rückkehr zum Betrieb gereinigt und desinfiziert werden

6. Sanierungs- und Gesundheitsüberwachung

- 6.1
- Betriebe, die sich zur freiwilligen CAE-Sanierung verpflichtet haben, müssen alle Tiere des Bestandes eindeutig und unverwechselbar kennzeichnen. Eine eindeutige Identifizierung der Tiere muss gewährleistet sein.
 - Alle Untersuchungsergebnisse sind den Verbänden umgehend zuzustellen, zwecks Überprüfung der Einzeltier Kennzeichnung in den Bestandslisten.
 - Jeder Verdacht auf Erkrankung von CAE zieht eine Blutuntersuchung nach sich (Pkt. 1.1).
 - Die Blutentnahme erfolgt durch Tierärzte/Tiergesundheitsdienst und ist in einem dafür anerkannten Institut durchzuführen. **(zum Ausschluss von Kreuzreaktionen auf die BT-Impfung ist der Pourquet-Test anzuwenden!)**
 - Der Tierbesitzer ist verantwortlich für eine korrekte Aufzeichnung der Daten bei der Blutentnahme.

7. Zuständigkeiten

Untersuchungsstelle

Untersuchungsstelle in Westfalen-Lippe...ist z.B.das:

- [Staatliches Veterinäruntersuchungsamt Arnsberg, Zur Taubeneiche 10-12, 59821 Arnsberg, Tel.: 02931 – 809-0](#)

Überwachung

- Der Westfälische Ziegenzuchtverband führt ein Verzeichnis aller Betriebe, die am CAE-Sanierungsprogramm teilnehmen. Er überwacht die Einhaltung der vorgenannten Bestimmungen. Nach vollendeter Sanierung wird eine Bescheinigung über den CAE-Status des Betriebes ausgestellt.

8. Beitritt zu dem Sanierungsverfahren

- Jeder Züchter und Halter in Westfalen-Lippe kann sich dem freiwilligen CAE-Sanierungsverfahren anschließen
- Die Verpflichtungserklärung (Anlage) nimmt der Westfälische Ziegenzuchtverband entgegen

9. Schlussbemerkung

Die o. a. Richtlinie wurde in der vorstehenden Fassung am 15. April 2010 beschlossen und tritt ab sofort in Kraft.